

EFEKTIFITAS RELAKSASI BENSON TERHADAP PENURUNAN NYERI PASIEN PASCA *SECTIO CAESAREA*

Afnijar Wahyu
STIKES Hang Tuah Tanjung Pinang
Email. wafniwahyu@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengaruh relaksasi benson terhadap penurunan rasa nyaman nyeri pasien pasca op section caesarea, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain *Quasi eksperimen Design*. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus untuk penelitian kuasi eksperimen dengan desain *One group Pre Test dan Post Tes* dengan jumlah sampel 22 orang. Teknik relaksasi benson dilakukan setelah dua hari *post op section caesarea* dengan durasi 5-10 menit. Analisis menggunakan *Wilcoxon* menunjukkan *p Value* $0.000 p \leq 0.05$ yang artinya ada pengaruh relaksasi benson terhadap penurunan rasa nyaman nyeri pasien *pasca op sectio caesarea* di RSUD Raja Ahmad Thabib dan diharapkan dapat menjadikan terapi relaksasi benson sebagai acuan pengobatan alternatif untuk menurunkan rasa nyaman nyeri pada pasien *post op section caesarea*.

Kata Kunci: Relaksasi Benson, *Sectio Caesarea*

ABSTRACT

The purpose of this research was to know the relation of Benson relaxation effect to the decrease of the comfortable feeling of patients' pain after op section caesarea. This research used quantitative method with Quasi Experimental Design. The sampling technique used the formula of quasi experimental research with the design of one group Pre Test and Post Tests with 22 samples. Benson relaxation technique was performed after two days post op section of caesarea with a duration of 5-10 minutes. The analysis was carried out through Wilcoxon indicated p Value $0.000 p \leq 0.05$ which means that there was a benson relaxation effect on the decrease of the comfortable feeling of pain in post-op patient sectio caesarea in RSUD Raja Ahmad Thabib and is expected to make benson relaxation therapy as a reference of alternative medicine to decrease pain relief in post patient op section caesarea.

Keywords: Sectio Caesarea, Benson Relaxatio

PENDAHULUAN

Tindakan pembedahan sering disebut dengan Operasi. Operasi merupakan salah satu layanan yang ada di Rumah Sakit. Salah satu tindakan operasi yang dilakukan di Rumah Sakit adalah operasi *section caesarea*. Menurut (Pohan, 2007) Operasi *section caesarea* merupakan operasi yang paling umum dialami oleh ibu yang akan melahirkan. Jumlah operasi *section caesarea* mencapai 50% dari seluruh persalinan di Rumah Sakit (Melisa, 2012).

Sectio caesarea adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus. Proses kehamilan, persalinan, dan nifas tidak senantiasa berlangsung secara fisiologi namun dapat pula secara patologi. Oleh karena itu pengawasan yang teliti dan terus menerus selama berlangsungnya ketiga proses itu harus dilakukan dengan seksama. Pengawasan bertujuan menemukan sedini mungkin kelainan yang dapat mempengaruhi proses-proses tersebut, agar mendapatkan penanganan yang sebaik-baiknya (Sjamsuhidajat 2010,).

Sectio caesarea adalah pengeluaran janin melalui insisi abdomen. Teknik ini digunakan jika kondisi ibu menimbulkan distress pada janin atau jika telah terjadi distress janin. Sebagai kelainan yang sering memicu tindakan ini adalah malposisi janin, *plasenta previa*, diabetes ibu, dan disproporsi sefalopelvis janin dan ibu. *Sectiocaesarea* dapat merupakan prosedur elektif atau darurat (Datak, G, 2008).

Sectio Caesarea adalah salah satu bentuk pengeluaran fetus melalui sebuah irisan pembedahan yang menembus abdomen seorang ibu (*laparotomy*) dan uterus (*hiskotomy*) untuk mengeluarkan satu bayi atau lebih. *Sectio caesarea* adalah suatu tindakan untuk melahirkan bayi dengan berat diatas 5000 gram, melalui sayatan pada dinding uterus yang masih utuh (Guyton, 2010).

Untuk *sectiocaesarea* biasanya dilakukan anestesi spinal atau epidural. Apabila dipilih anestesi umum, maka persiapan dan pemasangan duk dilakukan sebelum induksi untuk mengurangi efek depresif obat anestesi pada bayi (Gruendemann, 2006). Indonesia, *sectiocaesarea* hanya dilakukan atas dasar indikasi medis tertentu dan kehamilan dengan komplikasi. Hasil Riskesdas (2013) menunjukkan kelahiran, dengan bedah *sectio caesarea* sebesar 9,8% dari total kelahiran, dengan proporsi tertinggi di DKI Jakarta yaitu 19,9% (Depkes, 2013). Pada pasien pasca operasi *section caesarea* akan terdapat bekas luka pembedahan dan luka pembedahan tersebut akan menimbulkan rasa nyeri, nyeri pasca operasi *section caesarea* merupakan hal yang wajar ketika efek pembiusan telah habis, dengan demikian nyeri sangat membuat pasien tidak nyaman, cemas dan rasa takut untuk mobilisasi (Potter & Perry, 2009). *Post Op sectio caesarea* akan menimbulkan nyeri hebat dan proses pemulihannya berlangsung lebih lama di bandingkan dengan persalinan normal (David T, 2007). Pernyataan ini didukung oleh Hestiantoro (2009), persalinan *sectio caesarea* memiliki nyeri lebih tinggi yaitu sekitar 27,3% dibandingkan dengan persalinan normal yang hanya sekitar 9%.

Nyeri adalah sensasi yang tidak menyenangkan dan sangat individual yang tidak dapat dibagi kepada orang lain. Nyeri dapat memenuhi seluruh pikiran seseorang, mengatur aktivitasnya, dan mengubah kehidupan orang tersebut (Berman & Koziar 2009). Stimulus nyeri dapat berupa stimulus yang bersifat fisik atau mental, sedangkan kerusakan dapat terjadi pada jaringan aktual atau pada fungsi ego individu (Potter & Perry, 2009).

Nyeri dapat diatasi dengan penatalaksanaan nyeri yang bertujuan untuk meringankan atau mengurangi rasa nyeri sampai tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh klien. Ada dua cara penatalaksanaan nyeri yaitu farmakologis dan non-

farmakologis (Smeltzer & Bare, 2008). Secara farmakologis dapat diatasi dengan menggunakan obat-obatan analgesik misalnya, *morphine sublimaze*, *stadol*, *Demerol* dan lain-lain (Tamsuri, 2012). Kelebihan dari penanganan farmakologis ini adalah rasa nyeri dapat diatasi dengan cepat namun pemberian obat-obat kimia dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan efek samping yang dapat membahayakan pemakainnya seperti gangguan pada ginjal (Yosep, 2007). Ada beberapa teknik non farmakologis yang dapat diterapkan dalam mengatasi nyeri yaitu teknik relaksasi benson, akupuntur, *transcutaneous elektrik nerve stimulations* (TENS), Kompres dengan suhu dingin panas, sentuhan pijatan dan hipnotis (Gondo, 2011).

Metode penatalaksanaan nyeri dapat dikelompokkan menjadi katagori yaitu farmakologi dan nonfarmakologi (Andramoyo, 2013). Metode pendekatan farmakologi lebih mahal, dan berpotensi mempunyai efek yang kurang baik. Sedangkan metode non farmakologi lebih murah, simple dan tanpa efek yang merugikan, (Prawirohardjo, S, 2008). Distraksi, *Relaksasi Benson*, dan imajinasi terbimbing merupakan beberapa teknik non farmakologi untuk mengurangi nyeri. Penatalaksanaan farmakologi, penggunaan metode farmakologi untuk mengendalikan nyeri membutuhkan perhatian terhadap enam benar yaitu benar obat, benar dosis, benar jalur, benar pasien dan benar pendokumentasian. Selain itu observasi terhadap efek samping obat merupakan tindakan keperawatan yang sangat penting (Hockenberry dan Wilson, 2009), analgesik non-narkotik dan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID), analgesik narkotik atau opiat, Obat tambahan (*Adjuvan*) (Manuba & Ida Bagus Gede, 2007).

Penatalaksanaan nonfarmakologis, ada sejumlah terapi nonfarma kologi yang di gunakan untuk mengurangi nyeri resepsi dan persepsi nyeri, dan dapat di gunakan pada keadaan akut. Tindakan non farmakologis mencakup intervensi perilaku koknitif adalah mengubah persepsi klien tentang nyeri, mengubah prilaku nyeri, dan memberi klien rasa pengendalian yang lebih besar (Potter dan Perry, 2006), relaksasi adalah suatu tindakan untuk membebaskan mental dan fisik dari ketegangan dan stres sehingga dapat meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Teknik relaksasi yang sederhana terdiri atas napas abdomen dengan frekuensi lambat, berirama. Pasien dapat memejamkan matanya dan bernapas dengan perlahan dan nyaman. Irama yang konstan dapat dipertahankan dengan menghitung dalam hati dan lambat bersama setiap inhalasi (“hirup, dua, tiga”) dan, (Nugroho, T, 2010)

Distraksi adalah memfokuskan perhatian pasien pada sesuatu selainyeri, atau dapat di artikan lain bahwa distraksi suatu tindakan pengalihan perhatian pasien ke hal-hal di luar nyeri. Dengan demikian, di harapkan pasien tidak terfokus pada nyeri lagi dan dapan menurunkan kewaspadaan pasien terhadap nyeri bahkan meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Distraksi diduga dapat menurunkan persepsi nyeri dengan menstimulasi sistem kontrol desenden, yang mengakibatkan lebih sedikit stimuli nyeri yang di transmisikan ke otak. Keefektifan distraksasi tergantung pada kemampuan pasien untuk menerima dan membangkitkan input sensori selain nyeri (Mutaqin, 2008). Teknik ini biasanya tidak efektif di berikan kepada pasien yang mengalami nyeri berat atau nyeri akut. Hal ini di sebabkan pada nyeri berat atau akut, pasien tidak dapat berkonsentrasi dengan baik dan tidak cukup baik untuk ikut serta dalam aktifitas mental dan fisik yang kompleks. Imajinasi terbimbing adalah menggunakan imajinasi seseorang dalam suatu cara yang di rancang secara khusus untuk mencapai efek positif tertentu. Tindakan ini membutuhkan konsentrasi yang cukup, (Potter & Perry, 2005).

Upaya kondisi lingkungan klien mendukung untuk tindakan ini. Kegaduhan, kebisingan, bau menyengat, atau cahaya yang sangat terang perlu di pertimbangkan agar tidak mengganggu klien untuk berkonstrasi. Beberapa klien lebih rileks dengan cara menutup matanya. Berikut ini merupakan contoh bagai mana melakukan latihan imajinasi terbimbing kepada klien yang mengalami nyeri dengan menggabungkan nafas berirama lambat dengan suatu bayangan mental relaksasi dan kenyamanan, “Bayangkan bahwa setiap desah nafas yang anda hirup saat ini adalah energi penyembuh yang sedang mengalir pelan melalui urat nadi ke bagian sakit yang anda sedang alami. Lalu, bayangkan setiap hembusan nafas yang anda keluarkan telah membawa pergi jauh rasa sakit atau nyeri yang anda rasakan “. Lakukan kegiatan ini secara berulang dan teratur dalam beberapa menit (10-15 menit) untuk mendapat kan hasil yang maksimal, (Novitasari & Aryana, 2013)

Salah satu upaya non farmakologis untuk mengatasi nyeri adalah teknik relaksasi. Teknik relaksasi terbagi atas 4 macam yaitu relaksasi otot (*progresive muscle relaxation*), pernapasan (*diaphragmatic breathing*), meditasi (*attention focusing exercise*) dan relaksasi perilaku (*behavioral relaxation*) (Miltenbarger, 2004). Kelebihan latihan teknik relaksasi dibandingkan dengan teknik lain adalah teknik relaksasi lebih mudah dilakukan bahkan dalam kondisi apapun serta tidak memiliki efek samping apapun (Novitasari dan Aryana, 2013).

Relaksasi Benson merupakan pengembangan metode respon relaksasi pernafasan dengan melibatkan faktor keyakinan pasien yang dapat menciptakan suatu lingkungan internal sehingga dapat membantu pasien mencapai kondisi kesehatan dan kesejahteraan lebih tinggi (Benson & Proctor, 2011).

Prosedur relaksasi benson meliputi langkah-langkah respon relaksasi ini dapat dilakukan sebagai berikut, pilihlah kalimat spiritual yang akan digunakan, duduklah dengan santai, tutup mata, kendurkan otot-otot, bernafaslah secara alamiah (Ralph C, Benson. 2008). Mulai mengucapkan kalimat spiritual yang dibaca secara berulang-ulang khidmat, bila ada pikiran yang mengganggu, kembalilah fokuskan pikiran, lakukan 10 sampai 20 menit, untuk berhenti jangan langsung, duduklah dulu dan beristirahat. Buka pikiran kembali. Barulah berdiri dan melakukan kegiatan kembali. Menurut Benson, yang menemukan tehnik ini, cara ini bisa diubah misalnya tidak dengan posisi duduk tapi dilakukan sambil melaksanakan gerakan jasmani. Respon relaksasi dengan melibatkan faktor keyakinan pasien, yang dapat menciptakan suatu lingkungan internal sehingga dapat membantu pasien mencapai kondisi kesehatan dan kesejahteraan lebih tinggi Sanjaya, J. (2015).

Kebutuhan pelayanan kesehatan sebagai suatu kebutuhan akan kenyamanan, yang dihasilkan dari situasi pelayanan kesehatan yang stressful, yang tidak dapat dipenuhi oleh penerima support sistem tradisonal. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan fisik, psikospiritual, social dan lingkungan, yang kesemuanya membutuhkan monitoring. Relaksasi Benson ini sudah dilakukan dibeberapa penelitian eksperimen. Menurut penelitian yang telah dilakukan Novitasari dan Aryana (2013) yang berjudul pengaruh relaksasi benson terhadap penurunan tingkat stress lansia.

Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, didapatkan angka kejadian pasien dengan *sectio caesarea* pada bulan April 2014 yaitu sebanyak 65 ibu dan mengalami peningkatan drastis April 2015 dengan angka kejadian 574 ibu dilakukan operasi *sectio caesarea*. Dari data yang didapat di RSUD Raja Ahmad Tabib angka kejadian *sectio caesarea* pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai November ada 220 pasien menjalankan *sectio caesarea* dan didapatkan juga angka kejadian di Rumkital

Dr.Midiyanto Suratani pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai Desember ada pasien 156 pasien. Dapat disimpulkan bahwa angka prevalensi pada penderita yang dilakukan operasi *sectio caesareate* banyak adalah RSUD Raja Ahmad Tabib.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Relaksasi Benson terhadap penurunan nyeri pasien pasca *sectio caesarea*. Karena relaksasi benson merupakan salah satu terapi yang dapat dilakukan perawat untuk membantu menurunkan skala nyeri pada pasien pasca *section caesarea*. di Rumah Sakit diRSUD Ahmad Tabib Tahun 2018.Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi relaksasi benson terhadap penurunan nyeri pasien *pascasectio caesarea* di RSUD Ahmad Thabib Tahun 2018. Diketahuinya distribusi karakteristik (usia, pendidikan dan suku) pasien dengan skala nyeri pada pasien *pascasectio caesarea* sebelum dilakukan Relaksasi Benson, diketahuinya distribusi skala nyeri pada pasien pasca *sectio caesarea* sesudah dilakukan Relaksasi Benson, diketahuinya seberapa besar pengaruh relaksasi Benson terhadap penurunan skala nyeri pada pasca *sectio caesarea*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen semu (*Quasi eksperimen*) yaitu penelitian yang menguji coba suatu intervensi pada kelompok subjek dengan atau tanpa kelompok pembandingan namun tidak dilakukan randomisasi untuk memasukkan subjek kedalam kelompok eksperimen perlakuan atau kontrol

Penelitian ini menggunakan rancangan *One Group Pre Test* dan *Post test*. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan pertama (*Pre test*) terlebih dahulu sebelum diberikan intervensi perlakuan, setelah itu diberikan intervensi kemudian dilakukan pengamatan akhir (*Post test*).

Pre test *Perlakuan* *Post test*

01	X	02
----	---	----

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian (Notoatmojo, 2010)

Keterangan:

- 01 : Nyeri sebelum dilakukan relaksasi benson
- X : Dilakukan intervensi relaksasi benson
- 02 : Nyeri sesudah dilakukan relaksasi benson

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merupakan keseluruhan objek yang di teliti tersebut (Notoadmodjo, 2010). Pendapat lain menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan jumlah subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Wiratna, 2014).Populasi pada penelitian ini yaitu klien dengan nyeri *pasca secsio caesarea* di RSUD Raja Ahmad Thabib tahun 2017 dengan jumlah 220 orang.

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui teknik sampling. Sedangkan teknik sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada (Nursalam, 2013). Pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil menurut (Arikunto, 2010) yang menyatakan jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang, dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih sehingga sampel dalam penelitian ini adalah:

Kriteria inklusi dalam penelitian ini sebagai berikut, Klien dengan nyeri *pasca sectio caesarea* di RSUD Raja Ahmad Thabib, klien dengan nyeri *pasca sectio caesarea* yang mampu memahami pertanyaan dan bersedia mengikuti prosedur, klien dengan pasca nyeri *pasca sectio caesarea* dengan tingkat nyeri ringan- sedang berada di wilayah kota Tanjungpinang. Klien dengan 2 hari *pasca sectio caesarea*, klien yang bersedia menjadi responden. Adapun kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah klien yang mengalami nyeri *pasca sectio caesarea* dengan skala berat, klien yang mengalami nyeri *pasca sectio caesarea* yang tidak mampu memahami dan tidak bersedia mengikuti prosedur.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena data yang terkumpul digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Notoatmodjo, 2010). Dalam mengumpulkan data pada penelitian, Peneliti menggunakan lembar observasi. Setelah pengumpulan data dilakukan, tahap selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan proses komputerisasi, langkah-langkah proses pengolahan data sebagai berikut: 1) *Editing* (Proses penyuntingan), *Editing* adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Secara umum *editing* dilakukan untuk mengecek, atau perbaikan isi lembar observasi atau penulisan hasil pengukuran skala nyeri, 2) *Coding* (Pengkodean data), *Coding* yaitu melakukan pemberian kode (angka) terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian kode data ini sangat penting bila pengolahan data dan analisis data menggunakan komputer, 3) *Entry Data* (Memasukkan data), Proses memasukan data dari hasil observasi dari responden akan diolah melalui komputer pada program *statistika*. Pengolah data agar dianalisis. Data yang telah di *entri* dengan menggunakan komputer, setelah semua data observasi terpenuhi dan benar, dan sudah melewati proses pengkodean dan tabulasi, maka langkah selanjutnya peneliti akan memproses data agar dapat dianalisis, 4) *Scoring*, Data yang diolah telah dimasukkan dan diberikan penilaian skor masing-masing sehingga data tersebut dapat dianalisis, 5) *Cleaning* *Cleaning* merupakan kegiatan pemeriksaan kembali data yang sudah dimasukkan, apakah ada kesalahan atau tidak. Apabila semua data dari setiap sumber data atau responden selesai maka data-data tersebut siap untuk dianalisis, 6) Teknik analisa data, Analisa data bertujuan untuk menjelaskan tentang metode statistika yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian (Hidayat, 2009).

Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini dibagi menjadi tiga tahapan waktu, yakni persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan. Tahap persiapan dimulai pada tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017. Pada tahap persiapan ini peneliti melakukan studi pendahuluan dan studi kepustakaan hingga dilanjutkan dengan penyusunan proposal, sidang proposal, dan revisi proposal hingga diizinkan untuk melakukan penelitian. Tahap pelaksanaan untuk pengumpulan data di mulai pada tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018. Tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data dan penyusunan laporan penelitian yang dimulai tanggal 28 Maret 2018 sampai tanggal 20 April 2018.

Analisa Penelitian

Analisa data dalam penelitian terdiri dari analisis univariat dan analisis bivariat (Notoatmodjo, 2010), yaitu 1) Uji Univariat, Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2010). Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari setiap variabel (Notoatmodjo, 2010). Pada penelitian ini analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan variabel skala nyeri sebelum dan sesudah diberikan perlakuan relaksasi benson di RSUD Raja Ahmad Tabib 2018, 2) Uji Bivariat, Analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2010). Analisa bivariat pada penelitian ini menggunakan uji statistika non parametrik yaitu test uji Wilcoxon dimana bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara data yang berpasangan, menguji komparasi antara 2 pengamatan sebelum dan sesudah dan mengetahui efektifitas suatu perlakuan.

Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan antara lain membuat surat izin penelitian dari institusi pendidikan untuk diserahkan ketempat penelitian, meminta izin untuk melakukan penelitian di wilayah yang sudahdipilih, membuat jadwal penelitian, memilih responden sesuai kriteria inklusi, menjelaskan prosedur penelitian, Memberikan lembar persetujuan (*informed consent*) kepada responden, melakukan *pre test* pada penderita dengan perkiraan waktu 10 menit, melakukan pemberian perlakuan yaitu relaksasi benson pada pasien *pasca op sectio caesarea* serta melakukan *post test* setelah perlakuan dengan perkiraan waktu 10 menit.

HASIL PENELITIAN

Analisa Univariat

Tabel 1
Karakteristik responden

Variabel	N	%
Katagori umur:		
25-30 Tahun	11	50
31-34 Tahun	11	50
Tingkat pendidikan:		
SD		
SMP	3	13,7
SMA	3	13,7
S1	10	45
	6	27,2

Deskripsi data hasil penelitian ini adalah tentang pengaruh pemberian Relaksasi Benson Terhadap Penurunan Nyeri pasien *Pasca Sectio Caesarea* di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib. Dengan Jumlah responden sebanyak 22 responden. Deskripsi data dari hasil penelitian ini menggunakan analisis univariat bertujuan untuk mendiskripsikan karakteristik usia, pendidikan. Analisis bivariat bertujuan untuk melihat pengaruh relaksasi benson terhadap rasa nyaman nyeri. Penelitian ini menggunakan uji statistik *Wilcoxon test*. Deskripsi data dalam penelitian ini disajikan Dalam bentuk tabel.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari 22 orang respondend, distribusi responden usis 25-30 tahun dengan jumlah 11 orang respondend (50 %), sedangkan menurut pendidikan terakhir yang terbanyak pendidikan menengah atas serjumlah 10 orang responden (45 %).

Tabel 2
Distribusi rata-rata nyeri *section caesarea* saat *pre-test*

Keterangan nyeri	N	%
Nyeri Berat	0	0
Nyeri Sedang	18	82
Nyeri Ringan	4	18
Tidak Nyeri	0	0

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui skala nyeri dari 22 responden sebelum diberikan relaksasi benson sebagian besar responden memiliki skala nyeri sedang sebanyak 18 (82), dan nyeri ringan 4 (18) responden.

Tabel 3
Distribusi rata-rata nyeri *section caesarea* saat *post-test*

Keterangan nyeri	N	%
Nyeri Berat	0	0
Nyeri Sedang	4	18
Nyeri Ringan	18	82
Tidak Nyeri	0	0

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui skala nyeri dari 22 responden sebelum diberikan relaksasi benson sebagian besar responden memiliki skala nyeri sedang sebanyak 4 (18), dan nyeri ringan 18 (82) responden

Analisa Bivariat

Tabel 4
Perbedaan Rata-rata nyeri pada pasien *pasca section caesarea* sebelum dan sesudah diberikan Relaksasi Benson

Variabel	Mean	SD	Min	Max	<i>P Value</i>
Skala nyeri <i>pre</i>	4,55	1.05	3	6	0,000
		7			
Skala nyeri <i>post</i>	3,00	7.33	2	4	

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil analisi menunjukkan median skala nyeri sebelum dilakukan relaksasi benson adalah 4,55. Nilai skala nyeri sebelum dilakukan terapi benson minimum adalah 3 maksimum 6. Dapat dilihat bahwa hasil analisa menunjukkan median skala nyeri sesudah dilakukan relaksasi benson adalah 3,00. Nilai skala nyeri sebelum dilakukan relaksasi benson minimum adalah 2 maksimum.

Pengujian Persyaratan Analisis

Setelah didapatkan data dari hasil penelitian maka akan diolah menggunakan statistika. Dan terlebih dahulu data akan diuji menggunakan uji normalitas data untuk mengetahui bagaimana distribusi penyebaran data dan untuk mengetahui uji apa yang cocok untuk digunakan mengolah data hasil penelitian. Dalam penelitian ini distribusi data rasa nyaman nyeri *pretest* maupun *posttest* tidak terdistribusi secara normal dengan hasil nilai uji *Shapiro-Wilk* sebesar 0,001 selain itu skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah numerik dengan data yang berpasangan sehingga analisis statistik yang akan digunakan adalah uji nonparametric *Wilcoxon*.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis statistik adalah pernyataan hipotesis yang digunakan untuk kepentingan uji statistik terhadap data hasil penelitian. Hipotesis statistik dirumuskan untuk ditolak (Dharma, 2011). Artinya jika hipotesis statistik ditolak maka hipotesis kerja diterima atau sebaliknya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Ada pengaruh pemberian relaksasi benson terhadap rasa nyaman nyeri pasien *pasca op section caesarea* di RSUD Raja Ahmad Thabib.

PEMBAHASAN

Karakteristik responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pasien nyeri pasca section caesarea di RSUD Raja Ahmad Thabib didapatkan bahwa responden yang berusia 25-30 tahun sebanyak 11 orang (50%) dan pada usia 31-34 tahun sebanyak 11 orang (50 %). Rentang umur 20-34 tahun merupakan rentang umur wanita subur. Menurut (Hestiantaro, 2009), salah satu faktor yang mempengaruhi respon nyeri adalah usia, usia merupakan variable yang penting yang mempengaruhi nyeri. Perbedaan perkembangan yang ditemukan diantara kedua kelompok usia dapat mempengaruhi cara bereaksi terhadap nyeri.

Anak yang masih kecil mempunyai kesulitan memahami nyeri dan prosedur yang dilakukan perawat yang menyebabkan nyeri. Anak-anak kecil yang belum dapat mengucapkan kata-kata juga mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya secara verbal dan mengekspresikan nyeri kepada orang tua atau petugas kesehatan. Pada sebagian anak terkadang segan untuk mengungkapkan keberadaan nyeri yang ia alami, disebabkan mereka takut akan tindakan perawatan yang harus mereka terima nantinya.

Pada pasien lansia, seorang perawat harus melakukan pengkajian lebih rinci ketika seorang lansia melaporkan adanya nyeri. Sering lansia memiliki sumber nyeri yang lebih dari satu. Terkadang penyakit yang berbeda-beda yang diderita lansia menimbulkan gejala yang sama, sebagai contoh nyeri dada dapat timbul karena gejala arthritis pada spinal dan gejala pada gangguan abdomen. Sebagian lansia terkadang pasrah terhadap apa yang mereka rasakan, mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi penuaan yang tidak bisa dihindari.

Meskipun banyak lansia mencari perawatan kesehatan karena nyeri, lansia yang lainnya enggan untuk mencari bantuan, bahkan ketika mengalami nyeri hebat, karena mereka menganggap bahwa nyeri yang dirasakan adalah bagian dari proses penuaan yang normal yang terjadi pada setiap lansia. Diperkirakan lebih dari 85% dewasa tua mempunyai sedikitnya satu masalah kesehatan kronis yang dapat menyebabkan nyeri. Lansia cenderung untuk mengabaikan nyeri dan menahan nyeri yang berat dalam waktu yang lama sebelum melaporkannya atau mencari perawatan kesehatan. Sementara

sebagian yang lainnya tidak mencari perawatan, karena merasa takut nyeri tersebut menandakan penyakit yang serius atau mereka takut kehilangan kontor.

Responden berasal dari berbagai suku yaitu Melayu, Batak, Boyan, Jawa, Minang dan Bugis dengan suku terbanyak adalah jawa sebanyak 10 orang (46%). Sampai saat ini belum dinyatakan bahwa kejadian *section caesarea* lebih banyak pada suku tertentu, sehingga karakteristik tersebut tidak berperan dalam kejadian pasien yang mengalami *section caesarea*, Namun sesuai dengan penelitian Syahriyani, (2010) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nyeri seseorang diantaranya usia, jenis kelamin, dan kebudayaan.

Berdasarkan tingkat pendidikan didapatkan bahwa status pendidikan responden terbanyak adalah SMA yang berjumlah 10 responden (45 %). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Patasik, Tangka, Rottie (2013) yang menyatakan bahwa secara umum responden *section caesarea* berdasarkan tingkat pendidikan SMA Yitu sebanyak 18 responden (90,0%). Banyaknya responden setelah lulus SMA lebih disebabkan responden tidak melanjutkan ke perguruan tinggi melainkan memilih untuk menikah.

Keyakinan dan nilai-nilaikebudayaan memengaruhi cara individu mengatasi nyeri. Individu mempelajari apa yang diharapkan dan apa yang diterima oleh kebudayaan mereka. Hal ini meliputi bagaimana bereaksi terhadap nyeri (Potter & Perry, 2006). Budaya dan etnisitas berpengaruh pada bagaimana seseorang merespon terhadap nyeri. Sejak dini pada masa kanak-kanak, individu belajar dari sekitar mereka respons nyeri yang bagaimana yang dapat diterima atau tidak diterima.

Tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku dan menghasilkan banyak perubahan, khususnya pengetahuan dibidang kesehatan.Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula menerima informassi dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki.Tingkatpendidikan seseorang dalam menerima informasi dan mengolahnya sebelum menjadi prilaku yang baik maupun buruk sehingga berdampak terhadap status kesehatannya (Notoadmojo, 2010).

Hasil pengamatan penelitian yang lebih lanjut terhadap nyeri yang dialami pasien pasca *section caesarea* di RSUD Raja Ahmad Thabib dijumpai hasil analisis. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti Relaksasi benson saat *pretest* didapatkan nilai median 4,50 dan masih berada pada nyeri sedang setelah dilakukan *post test* 3,00. *P value* untuk relaksasi benson $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya ada pengaruh penurunan rasa nyaman nyeri pada pasien *pasca section caesarea* pada perlakuan relaksasi benson.

Maka dari itu perlakuan relaksasi benson terhadap masing-masing pasien mencapai hasil yang maksimal dengan penuruan rasa *nyeri pasca section caesarea* yang rendah atau pun ada pengaruh setelah dilakukan perlakuan relaksasi benson. Sebenarnya, persalinan melalui bedah *sectio caesarea* tidak mempengaruhi persalinan berikutnya harus berlangsung secara operasi atau tidak. Apabila memang ada indikasi yang mengharuskan dilakukannya tindakan bedah, seperti bayi terlalu besar, panggul terlalu sempit atau jalan lahir tidak mau mebuca, partus tak maju, operasi bisa saja dilakukan.

Menurut Anita (2015) relaksasi benson merupakan pengembangan metode respon relaksasi pernafasan dengan melibatkan faktor keyakinan pasien yang dapat menciptakan suatu lingkungan internal sehingga dapat membantu pasien mencapai kondisi kesehatan dan kesejahteraan lebih tinggi (Benson & Proctor, 2000).

Relaksasi benson adalah suatu jenis terapi untuk penanganan kegiatan mental dan menjauhkan tubuh dan pikiran dari rangsangan luar untuk mempersiapkan tercapainya hubungan yang lebih dalam dengan pencipta, yang dapat dicapai dengan metode *hypnosis*, meditasi yoga, dan bentuk latihan-latihan yang ada hubungannya dengan penajakan pikiran (Kasdu. 2003). Relaksasi benson merupakan pengembangan metode respon relaksasi dengan melibatkan keyakinan pasien, mendapat menciptakan suatu lingkungan tenang sehingga dapat membantu pasien mencapai kondisi kesehatan dan kesejahteraan lebih tinggi (Purwanto, 2011).

Relaksasi benson merupakan tehnik relaksasi yang digabungkan dengan keyakinan/keimanan yang dianut oleh pasien. Ungkapan yang dipakai dapat berupa nama tuhan atau kata-kata lain yang dimiliki oleh efek menenangkan bagi pasien yang dibaca secara berulang-ulang (Benson dan Proctor, 2011). Relaksasi benson yaitu tehnik pengobatan untuk menghilangkan nyeri, insomnia (tidak bisa tidur).

Cara pengobatan ini merupakan pembagian pengobatan spritual. Pada tehnik ini pengobatan sangat fleksibel dapat dilakukan dengan bimbingan mentor, bersama-sama atau sendiri. Tehnik ini merupakan upaya untuk memusatkan perhatian pada suatu fokus yang menyebut berulang-ulang kalimat ritual dan menghilangkan berbagai pikiran yang mengganggu. Tehnik pengobatan ini dapat dilakukan setengah jam 2 kali sehari (Sanjaya, J. 2015).

Menurut Purwanto (2011), tujuan dilakukannya relaksasi benson adalah untuk menciptakan suasana *intern* yang nyaman sehingga mengalirkan fokus terhadap sensasi nyeri pada hipotalamus sehingga dapat menurunkan sensasi nyeri yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan.

Mansjoer, dkk, (2008) mengatakan bahwa nyeri merupakan suatu mekanisme produksi bagi tubuh, timbul ketika jaringan sedang rusak, dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rasa nyeri. Selanjutnya, Judha M, (2012) mengatakan bahwa nyeri adalah pengalaman pribadi, subjektif, yang dipengaruhi oleh budaya, persepsi seseorang, perhatian dan variabel-variabel psikologis lain, yang mengganggu perilaku berkelanjutan dan memotivasi setiap orang untuk menghentikan rasa tersebut.

Judha M, (2012), menyatakan nyeri didefinisikan sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan, baik sensori maupun emosional yang berhubungan dengan risiko atau aktualnya kerusakan jaringan tubuh. Prasetyo, (2010) menyatakan bahwa hanya klienlah yang paling mengerti dan memahami tentang nyeri yang ia rasakan. Oleh karena itulah dikatakan klien sebagai *expert* tentang nyeri yang ia rasakan.

Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi persepsi individu terhadap nyeri. Sebagai tenaga kesehatan, seorang perawat perlu memahami faktor-faktor tersebut agar dapat memberikan pendekatan yang tepat dalam pengkajian dan perawatan terhadap klien yang mengalami masalah nyeri (Andarmoyo & Suharti, 2015)

Menurut Syahriyani (2010), perbedaan tingkat nyeri yang dipersepsikan oleh pasien disebabkan oleh kemampuan sikap individu dalam merespon dan mempersepsikan nyeri yang dialami. Kemampuan mempersepsikan nyeri dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berbeda diantara individu. Tidak semua orang terpapar terhadap stimulasi yang sama mengalami intensitas nyeri yang sama. Sensasi yang sangat nyeri bagi seorang mungkin hampir tidak terasa bagi orang lain.

Gambaran nyeri *pasca section caesarea* sebelum dan sesudah menggunakan relaksasi benson pada pasien *pasca section caesarea*

Hasil pengamatan penelitian terhadap nyeri *pasca section caesarea* sebelum dilakukan teknik relaksasi benson, diketahui sebagian besar responden memiliki nyeri sedang sebanyak 18 orang (81,8 %) dan pada saat *post test* diketahui sebagian besar memiliki nyeri sedang sebanyak 4 orang (18,4 %). Secara garis besar terdapat perubahan nyeri pada pasien saat sebelum dan sesudah menggunakan teknik relaksasi benson. Terlihat ada perubahan katagori nyeri yang berarti setelah dilakukan teknik relaksasi benson. Dengan kata lain dengan relaksasi benson dapat mengurangi nyeri pasien *pasca section caesarea*. Menurut peneliti, yang menyebabkan terjadinya penurunan nyeri setelah melakukan teknik relaksasi benson disebabkan oleh pengalihan fokus nyeri.

Menurut Purwanto (2011), tujuan dilakukannya relaksasi benson adalah untuk menciptakan suasana intern yang nyaman sehingga mengalirkan fokus terhadap sensasi nyeri pada hipotalamus sehingga dapat menurunkan sensasi nyeri yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan.

Relaksasi benson dalam hal berperan untuk menurunkan intensitas persepsi nyeri bekerja dengan cara mengalihkan fokus seseorang terhadap nyeri dan dengan menciptakan suasana nyaman serta tubuh yang rileks maka tubuh akan meningkatkan proses analgesia endogen hal ini diperkuat dengan adanya kalimat atau mantra yang memiliki efek menenangkan atau menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi korteks serebri karena tehnik relaksasi benson menyatakan unsur religi didalamnya dimana semua umat yang percaya akan "sang pencipta" juga percaya akan "kuasanya" dimana hal ini semakin memberikan efek relaksasi yang pada akhirnya meningkatkan proses *analgesia endogen* sehingga mampu mengurangi persepsi nyeri seseorang.

Memindahkan pikiran-pikiran yang berorientasi pada hal-hal yang logis dan yang berada diluar diri harus ada suatu rangsangan yang konstan yaitu satu kata atau frase singkat yang diulang-ulang dalam hati sesuai dengan keyakinan. Kata atau frase yang singkat merupakan fokus dalam melakukan relaksasi benson. Fokus terhadap kata atau frase singkat akan meningkatkan kekuatan dasar respons relaksasi dengan memberi kesempatan faktor keyakinan untuk memberi pengaruh terhadap penurunan aktifitas saraf simpatik (Benson & Proctor, 2009). Salah satu kesulitan untuk dalam pelaksanaan Relaksasi Benson adalah pikiran yang mengembara, namun dapat dicegah dengan pengulangan kata atau frase. Mata biasanya terpejam apabila tengah mengulang kata atau frase singkat. Relaksasi Benson dilakukan 1 sampai 2 kali sehari selama 10-20 menit. Waktu yang baik untuk mempraktekan Relaksasi benson adalah sebelum makan atau beberapa jam sesudah makan, karena selama melakukan relaksasi, darah akan dialirkan kekulit, otot-otot ekstremitas, otak dan menjauhi daerah perut sehingga efeknya akan bersaing dengan proses makanan (Benson & Proctor, 2009).

Pengaruh pemberian relaksasi benson terhadap penurunan nyeri pada pasien

Setelah didapatkan data dari hasil penelitian maka akan diolah menggunakan statistika. Dan terlebih dahulu data akan diuji menggunakan uji normalitas data untuk mengetahui bagaimana distribusi penyebaran data dan untuk mengetahui uji apa yang cocok untuk digunakan mengolah data hasil penelitian. Dalam penelitian ini distribusi data rasa nyaman nyeri *pre test* maupun *post test* tidak terdistribusi secara normal dengan hasil nilai uji *Shapiro-Wilk* sebesar 0,001 selain itu skala yang digunakan dalam

penelitian ini adalah numerik dengan data yang berpasangan sehingga analisis statistik yang akan digunakan adalah uji non parametric *Wilcoxon*.

Menurut Purwanto (2011), tujuan dilakukannya relaksasi benson adalah untuk menciptakan suasana intern yang nyaman sehingga mengalihkan fokus terhadap sensasi nyeri pada hipotalamus sehingga dapat menurunkan sensasi nyeri yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan.

Menurut Andarmoyo (2013), menyebutkan pada awal terjadinya nyeri dimulai dengan adanya stimulus nyeri dalam hal ini stimulus mekanik (pasca operasi TURP) yang dihantarkan oleh *nociceptor mekanis* menuju sistem syaraf pusat lalu stimulus nyeri ini diubah menjadi suatu aktivitas listrik yang akan diterima ujung-ujung syaraf atau proses ini dikenal dengan nama transduksi. Selanjutnya adalah proses transmisi dimana impuls nyeri dari *nociceptor* akan menuju *korteks serebri* atau tempat memproses sensori.

Efektifitas relaksasi benson terhadap nyeri *pasca section caesarea*

Berdasarkan hasil uji statistika dengan menggunakan uji *Wilcoxon* didapatkan nilai *p value* nyeri 0,000 berarti $p\text{ value} < 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa nyeri pada ibu *pasca section caesarea* dengan menggunakan relaksasi benson lebih efektif untuk menurunkan skor nyeri.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Puput Nur Fadilah, Puji Astuti, dan Wesiana Heris Santy (2016) yang berjudul pengaruh relaksasi *benson* terhadap penurunan skala nyeri dada kiri pada pasien *Acute Myocardial infarc* di RS Dr Moewardi Surakarta Tahun 2014. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa *p value* pada kelompok kontrol sebesar 0,004 ($\alpha=0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi analgetik berpengaruh terhadap penurunan skala nyeri pada respondend dengan AMI.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Penelitian Purwanto, (2011) dengan judul Pengaruh teknik relaksasi benson terhadap skala nyeri pada pasien post operasi di RSUP. Prof. Dr.R.D. Kandou dan RS Tk.III R.W Mongisidi Teling Manado. Hasil Uji Statistik *Wilcoxon Sigh Rank test* dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$) dan diperoleh *p value* 0,000 , $<0,05$.

Menurut Penelitian Anita Yusliana, Misrawatin dan Safri (2015) yang berjudul efektivitas relaksasi benson terhadap penurunan nyeri pada ibu *postpartum sectio caesarea*. Hasil uji statistika menggunakan uji *t independent*. Nilai *p value* (0,000) $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian relaksasi benson efektif terhadap penurunan skor nyeri pada ibu *post partumsectio caesarea*

Teknik relaksasi nafas dalam ini dapat merangsang tubuh menghasilkan *endorphin* dan *enfikelin* ini adalah zat kimiawi endogen yang berstruktur seperti opioid, yang mana *endorphin* dan *enfikelin* dapat menghambat imflus nyeri dengan memblok transmisi implus didalam otak dan medulla spinali.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 22 responden dan hanya menggunakan kelompok eksperimen tanpa kelompok kontrol dengan pemberian relaksasi benson di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib, maka peneliti menarik kesimpulan diketahui distribusi frekuensi pasien *pasca op section caesarea* berada pada usia (25 – 34 tahun) merupakan rentang umur wanita usia subur karena system reproduksinya sedang aktif-aktifnya, diketahui distribusi skala nyeri pada pasien

pasca section caesare sebelum dan sesudah diberikan relaksasi benson hasil *pre test* dengan nilai 4-6 (81,8 %) sedangkan *post test* dengan nilai 1-3 (81,8 %), pada hasil penelitian menggunakan uji statistik *Wilcoxon* yang menghasilkan nilai *p value*=0,000, yaitu *Ho* ditolak, yang artinya ada hubungan pemberian relaksasi benson dengan kejadian rasa nyaman nyeri pasien *pasca op section caesarea* di RSUD Raja Ahmad Thabib Tahun 2018.

SARAN

1. Untuk menjaga sikap loyalitas responden yang sudah baik, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas layanan secara terus menerus terutama dalam dimensi *responsiveness* terhadap pasien yang dinilai memiliki pengaruh paling besar dalam aspek kualitas layanan terhadap loyalitas pasien dalam penelitian ini.
2. Aspek dari kualitas pelayanan keperawatan yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman perawat tentang manajemen mutu serta aplikasi dalam manajemen ruangan dalam rangka mengelola pelayanan keperawatan beserta ruang rawat yang berorientasi pada kebutuhan pasien, dengan metode penugasan yang efektif maka kebutuhan pasien akan lebih terpenuhi.
3. Melakukan evaluasi secara berkala mengenai kualitas pelayanan keperawatan dan melakukan sistem keluhan dan saran dengan *customer care* secara rutin dengan memberikan kesempatan seluas luasnya pada pasien untuk memberikan saran, pendapat dan keluhan. Media yang dapat digunakan meliputi kotak saran dengan menyediakan kartu komentar yang dapat diisi langsung.
4. Penelitian ini digunakan sebagai dasar penelitian berikutnya dengan menggunakan variabel lain yang berhubungan dengan loyalitas pasien seperti kepuasan pasien, hambatan pindah, citra rumah sakit dan-lain sebagainya. Pengumpulan data dapat lebih dikembangkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam serta dengan rancangan penelitian yang berbeda agar data atau informasi yang didapatkan dapat lebih akurat dan mendalam.
5. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya melakukan analisis terkait klasifikasi nyeri apa yang dapat digunakan dengan terapi benson.

DAFTAR PUSTAKA

- Afroh, F., Mohamad Judha, Sudarti, (2012). *Teori Pengukuran Nyeri & Nyeri Persalinan*, Yogyakarta :Nuha Medika.
- Andarmayo, S, (2013), *Konsep dan Proses Keperawatan Nyeri*. Yogyakarta: ArRuzz media.
- Anita, Y., Misrawati &Safri.(2015). *Efektivitas Relaksasi Benson Terhadap Penurunan Nyeri Pada Ibu Postpartumsectio Caesarea*.Jurnal keperawatan Indonesia, vol 2 no 2, 944-952.Diperoleh dari<http://jki.ui.ac.id>diunduh tanggal2 Oktober 2017.
- Arikunto, Suharsimin. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Benson, H & Miriam, Z &Klipper.(2000). *Respon Relaksasi Teknik Meditasi Sederhana Untuk Mengatasi Tekanan Hidup*.Jakarta: Khalifah.
- Benson dan Proctor. (2011). *Dasar-Dasar Respon Relaksasi: Bagaimana Menghubungkan Respon Relaksasi Dengan Keyakinan Pribadi Anda* (Ahli Bahasa oleh Nurhasan. Bandung: Kaifah

- Berman, S., &Kozier.(2009). *Buku Ajar Praktik keperawatan klinis kozier*. Jakarta: EGC
- Datak, G., Yetti, K & Hariyati, S.T. (2008).*Penurunan nyeri pascabedah pasien turprostat melalui relaksasi benso*.*Jurnal keperawatan Indonesia*, vol 12 no 3, 173-178.Diperoleh dar <http://jki.ui.ac.id>diunduh tanggal2 Oktober 201.
- David T. Y. (2007). *Manual Persalinan*.Edis 3. Jakarta. EGC.
- Departemen Kesehatan RI. (2013). *Angka PenemuanKasus Sectio Caesarea*. Jakarta
- Dharma, Kelana, (2011).*Metodelogi Penelitian Keperawatan*. Cv Trans Info Media: Jakarta Timur.
- Gondo, H.K. (2011). Pendekatan nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri saat persalinan..*Jurnal CDK 185 vol 38 no.4*. Diperoleh tanggal 3 Oktober 2017 dari <http://kalbemed.com>
- Gruendemam & Fernsebner.(2006). *Buku Ajaran Keperawatan Perioperatif.*, Vol.2 Praktik. Jakarta: EGC
- Guyton, (2010).*Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC
- Hestiantaro, A. (2009). *Bayi Caesar lebih pintar mitos atau fakta*. Diperoleh tanggal 3 Oktober 2017 dari <http://citramedika.com>
- Hidayat A, dkk., (2009). *Asuhan Patologi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Hockenberry, M.J.,& Wilson, D. (2009).*Nursing care of infants and children*. (8thed). St.louis: Mosby Elsevier.
- Kasdu. (2003). *Operasi Caesar masalah dan solusinya*, Jakarta: Puspa Swara
- Mansjoer, Arif, dkk, (2008), *Kapita Selekta Kedokteran*, Jakarta: Media Aesculapius.
- Manuba, Ida Bagus Gede. (2007). *Pengantar Kuliah Obstetric*. Jakarta. EGC.
- Melisa. (2012) *Hubungan Dukungan Sosial Denga Kualitas Hidup Pasien RSUP PROF.DR.R.D Kandaou Manado*.Ejournal Keperawatan (E-KP) Vol 1 No 1.
- Miltenberger, R. (2004). *Behaviour modification, principles and procedures 3thed*. Belmont CA: Wadsworth Thomposn Learning
- Mutaqin, Arif. (2008). *Buku Ajaran Asuhan Keperawatan Kliien Dengan Gangguan Rasa Nyaman Terhadap Nyeri*. Jakarta: Salemba Medika
- Notoatmodjo S (2010). *Metode Penelitain Keshatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Novitasari, D., & Aryana, k.o. (2013). Pengaruh teknik relaksasi benson terhadap penurunan tingkat stress lansia di unit rehabilitas social wening wardoyoungaran. *Jurnal keperawatan jiwa vol 1 no 2, 186-195*.Diperoleh tanggal 3 Oktober 2017 dari<http://jurnal.unimus.ac.id>.
- Nugroho, T. (2010). *Kasus Emergency Kebidanan Untuk Kebidanan dan Keperawatan, Nuha Medica*, Yogyakarta.
- Nursalam, (2008, 2013).*Konsep dan Penerapan Metodelogi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan Edisi 2 dan 3*.Jakarta: Salemba Medika.
- Pohan, Imbolo (2007). *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran Jakarta: EGC
- Potter, & Perry, A.G (2005).*Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses dan Praktik*, Edisi 4 Volume 1. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, EGC.
- Potter, & Perry, A.G (2006).*Buku Ajaran Fundamental Keperawatan: Konsep. Proses dan praktik*. Vol.2 edk 4 Jakarta: EGC.
- Prawirohardjo, S. (2008).*Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustakan Sarwono Prawirohardjo. Profil Kesehatan 2008.

- Purwanto.(2011). *Pengaruh Latihan Relaksasi Religius Untuk Mengurangi Insomnia di Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ralph C, Benson. (2008). *Buku Saku Obstetri dan ginekologi*. Jakarta: ECG.
- Sanjaya, J. (2015). *Terapi Benson*. <http://jefry-sanjaya-stikesmuhkusus.blogspot.co.id/2015/12/terapi-banson.html>. Diakses pada 15 Oktober 2017.
- Sari, D.S. *Persalinan Normal vs operasi caesarea? Pahami, Pilih, dan tentukan dari sekarang*. Diperoleh dari <http://www.kemangmedicalcare.com>.Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2017
- Sjamsuhidajat dan De Jong. (2010). *Buku Ajaran Ilmu Bedah, Edisi 2*, Jakarta : EGC
- Smeltzer & Bare.(2008). *Texbook of Medical Surgical Nursing Vol.2. Philadelphia: Lippincot William & Wilkins*.
- Sujarweni, Wiratna V. (2014). *Metodologi Penelitian Keperawatan*. Yogyakarta: Gava Media
- Syahriyani, (2010). *aPengaruh Teknik Relaksasi Terhadap Perubahan Intensitas Nyeri pada Pasien Post Op Apendiktomi*.RSU TK II Pelamonia Makasar.
- Tamsuri, A. 2012. *Konsep dan penatalaksanaan nyeri*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Taufan Nugroho, (2011). *Anatomi Fisiologi Jantung dan Pembuluh Darah*. Jakarta: EGC
- Yosep, I. (2007). *Keperawatan Jiwa*. Bandung:Refika Aditama.